

# Riktlinjer vid sjukdom

## Anmälan om frånvaro till förskolan

Barnens frånvaro anmäls före kl. 7.30 på respektive avdelnings telefon,

Troll: 072-711 13 53

Älvor: 072-711 13 05

Var vänlig anmäl senast kl. 15.00 dagen innan barnen kommer tillbaka på respektive avdelnings telefon.

Vid föräldrar eller syskons sjukdom är det 9.00-14.00 som gäller som tid för barnomsorg. OBS! Har någon i familjen magsjuka får barnet stanna hemma tills alla i familjen är friska och det har gått 48 timmar.

## RIKTLINJER FÖR BARNENS VISTELSE I FÖRSKOLAN I SAMBAND MED SJUKDOM

### Allmänt

Efter sjukdom ska barnet vara feberfritt och det allmänna hälsotillståndet **gott** innan barnet återgår till förskolan. Barnet ska kunna och orka delta i barngruppens vanliga aktiviteter som kan innebära flera timmars utevistelse.

### Mediciner

Mediciner ges inte på förskolan med undantag av allergimedikiner och andra långvariga medicinska behandlingar (t.ex. diabetes).

### Penicillin/antibiotika

Efter minst två dagars behandling och om barnets allmäntillstånd orkar en aktiv förskoledag inklusive flera timmars utevistelse. Personalen ger inte barnet penicillin/antibiotika.

### Förkylningar

I början av en förkylning när näsa och ögon rinner är barnet som mest smittsamt och bör vara hemma. Efter feber bör barnet vara hemma en feberfri dag. När barnet är piggt och feberfritt kan det återkomma även med snuva. Det är personalen i samråd med föräldrarna som avgör om barnet orkar delta i förskolans verksamhet (även uteaktivitet i några timmar).

### Ögoninflammationer

Förkylningsvirus infekterar ofta även ögonen. I regel behövs ingen behandling och problemen går över samtidigt med förkylningen i övrigt. Bara om barnet har kladdiga och röda ögon bör barnet hållas hemma. Vid långvariga problem, mer än en vecka, rådfråga BVC eller husläkare.

### Magsjuka

Barn kan återgå till förskolan när det ätit normalt och inte kräkts eller haft vattentunn diarre under **2 dygn, (48 timmar)**. **Har någon i familjen magsjuka får barnet stanna hemma tills alla i familjen är friska och det har gått 48 timmar.**

**Vattkoppor**

Virusinfektion med stor smittsamhet. Börjar som blåsor som sedan torkar till skorpor. Smittfri när alla koppor är torkade. Barnet ska stanna hemma tills allmäntillståndet är gott och vattkopporna torkat.

**Halsfluss/Scharlakansfeber**

Stor smittsamhet. Får komma till förskolan när barnet orkar med det vanliga tempot i barngruppen.

**Svinkoppor/Impetigo**

Samma bakterie som ovan. Sätter sig som sår framför allt runt mun och näsa, men även runt nagelband eller öppna sår. Ska behandlas med Alsolsprit och penicillinsalva, ev. tabletter. Barnet ska stanna hemma tills utslagen torkat.

**Mollusker**

Vårtliknande virus, smittar framför allt bland barn före puberteten. Försvinner av sig själv inom 1-2 år utan behandling. Barnet kan vara på förskolan.

**Huvudlöss**

Smittar genom närbkontakt. Barn med huvudlöss ska behandlas hemma med apotekets receptfria preparat. Följ bruksanvisningen noga. Endast de barn och familjemedlemmar som har huvudlöss ska behandlas. Barnet kan vara på förskolan när det har behandlats.

**Springmask**

5-10 mm sytrådsliknande maskar som kan ses i avföringen och ändtarmsöppningen. Endast den person som har konstaterad springmask ska behandlas, finns receptfritt på apoteket. Noggrann handhygien, med kortklippta naglar förhindrar smitta. Barnet kan vara på förskolan efter behandling.

**Höstblåsor**

Vanlig sjukdom hos förskolebarn. Många barn blir smittade utan att bli sjuka. Barnets allmäntillstånd avgör om han/hon ska vara hemma.